

DESCRIPTION D'UN GOLIATHIDE NOUVEAU

par R. Braem.

Fornasinius Wesselsi n. sp. — ♂. Tête noir brillant, fortement ponctuée. Bord antérieur du clypeus légèrement sinué, les angles prolongés en une dent saillante, redressée. Du front part une corne droite, mince, plus large à la base, comprimée verticalement, fortement ponctuée, se terminant par deux pointes recourbées en dedans, en forme d'ancre; dessus caréné, le début de cette carène formant sur le front une faible saillie; par dessous, la corne, vue de profil, est d'abord parallèle, puis se relève jusqu'à son extrémité. Sur le front, de chaque côté de la base de la corne, au-dessus et en avant de l'œil, une dent saillante, obtuse. Antennes noires.



Pronotum suboctogonal, élargi au milieu, rebordé latéralement, médiocrement bombé; au milieu du bord antérieur, une très faible protubérance d'un noir brillant; sur les côtés, une très fine ponctuation, diminuant vers le milieu, où elle disparaît entièrement ainsi que contre l'écusson. D'un brun marron velouté; contre la marge, de chaque côté, un peu au-dessus de l'angle latéral, une très légère impression noirâtre, luisante; à chaque angle antérieur, une très petite tache allongée jaune pâle, grosse comme une tête d'épingle.

Écusson allongé, noir mat, velouté, brunâtre contre le corselet. Élytres allongées, lisses, d'un brun marron velouté; suture noirâtre. Pygidium noir, finement chagriné, frangé de poils noirs.

Dessous d'un noir brunâtre, très finement ponctué, excepté le milieu de l'abdomen. Saillie mésosternale peu saillante, formant, de profil, un angle droit.

Les pattes sont assez fortement ponctuées; les tibias antérieurs sont, en outre, très finement ridés au milieu de la face supérieure; ils sont glabres et armés d'une dent aiguë vers l'extrémité du bord externe; les tibias intermédiaires et postérieurs sont inermes et garnis au bord interne d'un peigne épais de longs poils noirs. Les tibias sont brun clair; les antérieurs ont l'extrémité et le bord

externe noirs, les deux autres paires ont l'extrémité et le bord interne noirs; les cuisses sont brun clair, avec le bord interne noir. Tarses noirs, les antérieurs plus longs, les autres de même longueur que les tibias.

Longueur du bord antérieur du clypeus à l'extrémité des élytres, 50 millimètres; largeur, 23 millimètres; longueur de la corne, 6 millimètres.

Loc. : Lusambo, Haut-Kassaï. Un seul exemplaire ♂.

Ce Goliathide m'a été rapporté du Congo par M. J.-H. Wessels, à qui je me fais un plaisir de le dédier. Il paraît se rapprocher sous certains rapports de l'espèce décrite par Nickerl (Stettin. entomolog. Zeitung, 1890, p. 13), sous le nom de *Sphyrorrhina* Charon, mais il en diffère par la conformation de la corne et des tibias antérieurs; la coloration présente aussi des différences notables.